

您是否有关于 COVID-19 疫苗的问题?

我们从有意接种 COVID-19 疫苗的孕妇和备孕妇女那里收集了一系列的常见问题。您的问题未被列出?访问 www.phila.gov/covid-19 或拨打 215-685-5488 以了解更多信息。

COVID-19 疫苗如何发挥作用?

COVID-19 疫苗是一种帮助您免疫系统与 COVID-19 对抗的药物。疫苗的注射剂数为一剂或两剂,这取决于疫苗的品牌。

疫苗会帮助您免疫(防御)系统识别 COVID-19 病毒。在接受注射后,疫苗将大大降低您的患病几率。

您是在注射 COVID-19 病毒吗?

否。COVID-19 疫苗包含的是不完整的 COVID-19 病毒片段。COVID-19 疫苗不包含活的 COVID-19 病毒。

在孕期接种 COVID-19 疫苗安全吗?

我们手头上关于孕期接种的数据有限,但仍在不断获取。早期数据并未显示接种疫苗不利于孕妇或其婴儿。最近的研究表明,在怀孕期间接种 COVID-19 疫苗可以把抗体传递给胎儿,这有可能帮助胎儿在出生后对 COVID-19 产生免疫。

随着越来越多的孕妇接种疫苗,数据也在不断地收集中,我们将继续了解该疫苗对孕妇和婴儿的影响。

如果我是一名孕妇,我是否应该接种 COVID-19 疫苗?

这取决于您的个人选择。与您的医生进行讨论可能会有所帮助。如果孕妇感染 COVID-19,则成为重症患者和发生早产的风险更高。做出决定时,务必权衡您感染 COVID-19 的风险与接种疫苗的未知风险。

如果我在哺乳期,我是否应该接种 COVID-19 疫苗?

专家认为这很大程度上是安全的。基于科学常识,认为疫苗对哺乳的婴儿无害。如果少量疫苗进入母乳,它将进入婴儿的胃中并被消化。且 COVID-19 疫苗的保护性抗体也可能通过母乳传递给婴儿。但是,由于疫苗试验并未包括处于哺乳期的个体,因此仍需要更多研究。

如果我在备孕期,我是否应该接种 COVID-19 疫苗?

根据我们了解的科学知识,COVID-19 疫苗不会影响怀孕能力。如果您有机会在怀孕前接种疫苗,则能够预防您怀孕期间感染 COVID-19。

接种疫苗后我还需要戴口罩和保持社交距离吗?

请继续佩戴口罩,直至您完全接种疫苗。在完成辉瑞或莫德纳疫苗第二剂接种两周后以及接种强生疫苗两周后,您将被视为完全接种疫苗。

一般而言,在大部分人都接种疫苗且病毒停止传播前,我们仍须小心防范。请继续遵守在特定场合佩戴口罩的指导方针。但是,完成疫苗接种的人士有许多事情可以安全放心地去做。如已接种疫苗,您无需接受 COVID-19 的常规检测,外出也无需接受隔离。在您接触过 COVID-19 感染者后,若您未产生任何症状,则您也无需接受隔离。

潜在的副作用是什么?

潜在短期副作用包括:手臂酸痛、全身肌肉酸痛、头疼、疲乏、畏寒和发烧。出现这些副作用表明您的免疫系统正在发挥作用,您的身体正在建立足以对抗 COVID-19 病毒的保护体系。

若我之前已感染过 COVID-19,我是否还需要接种疫苗?

是。我们不知道人们感染 COVID-19 之后受到保护时间的长短,因此仍建议您接种疫苗。但是,90 天内再次感染 COVID-19 的情况并不常见,因此,如果您最近感染了 COVID-19,可以将疫苗接种时间推迟到 90 天以后,或在解除隔离之后立即接种。

我可以在哪里接种 COVID-19 疫苗?

您可以跟您的医生、当地卫生中心、附近药房或社区卫生组织预约接种 COVID-19 疫苗。

