

Вопросы и ответы о COVID-19 и сезонном гриппе

Ноябрь 2022 г.

Часто задаваемые вопросы

- **COVID-19 и грипп вызываются одним и тем же вирусом?**
 - Грипп вызывается вирусом гриппа одного из типов: А или В.
 - Инфекция COVID-19 вызывается коронавирусом 2019 года, также известным как SARS-CoV-2.
- **Как защититься от COVID-19 и гриппа?**
 - Лучшие меры защиты: проходить вакцинацию и ревакцинацию, часто мыть руки, прикрываться при кашле и чихании, оставаться дома при симптомах заболеваний, очищать поверхности и предметы, к которым часто прикасаются, и обеспечивать медицинскую помощь в случае тяжелого течения болезни.
- **Что такое бустерные дозы?**
 - Бустерная доза — это дополнительная доза вакцины, которую вводят, чтобы усилить иммунитет, когда защита от первоначальной дозы начинает постепенно ослабевать.
- **Можно ли одновременно вакцинироваться от COVID-19 и от гриппа?**
 - Да, каждый может пройти вакцинацию одновременно от COVID-19 и от сезонного гриппа без опасности для здоровья.
- **Нужно ли вакцинироваться от гриппа несколько раз в году, как от COVID-19?**
 - Нет, вакцина от гриппа вводится один раз в год. Этого достаточно, чтобы защитить вас от штаммов (типов) вируса гриппа, которые, согласно прогнозам, вызовут наибольшее количество заболеваний в определенный период.
- **Кто находится в группах риска по COVID-19 и гриппу?**
 - Повышенный риск серьезных осложнений COVID-19 и гриппа наблюдается у людей в возрасте 65 лет и старше, людей с некоторыми заболеваниями и беременных женщин.
- **Может ли вакцинация вызвать COVID-19 или грипп?**
 - Вакцины не вызывают заболеваний. У вас могут возникнуть обычные побочные эффекты, такие как головная боль, лихорадка или боль в руке.
- **Вакцинация от гриппа защищает от COVID-19?**
 - Нет, вакцина от гриппа не защищает от COVID-19. Вакцина от гриппа действует только на вирус гриппа, предотвращая заражение и распространение инфекции.
- **Нужно ли детям проходить вакцинацию от COVID-19 и от гриппа?**
 - Да, вакцины от COVID-19 и от гриппа рекомендованы для использования у детей в возрасте 6 месяцев и старше.
 - Бустерные дозы вакцины от COVID-19 рекомендованы для детей в возрасте от 5 лет.

