



远离麻疹：了解相关信息

卫生部正在追踪费城的麻疹疫情。麻疹在某种程度上是一种危险疾病，对于婴幼儿而言尤为如此。麻疹比其他病毒更具传染性。

麻疹刚开始发作时通常会出现发烧、流鼻涕、咳嗽、眼睛发红以及口腔白点。几天之后，面部会开始出现红色皮疹，并向下蔓延至身体其他部位。

麻疹可导致严重的肺部感染（肺炎）、脑肿胀（脑炎）、长期影响、住院以及死亡。

麻疹如何传播？

麻疹会在咳嗽、打喷嚏或单纯只是呼吸的麻疹患者周围传播。麻疹可在麻疹患者出疹前和症状结束后传播。麻疹患者离开房间后，病菌可在房间内存活两小时。

预防麻疹的最佳方法是？

接种疫苗！建议在幼儿 12-15 个月大时接种麻腮风三联疫苗，并在幼儿满 4 岁时再次接种。6 个月以上的婴儿应在前往麻疹高发国家/地区之前接种一剂麻腮风三联疫苗。



约 5 名麻疹患者中就有 1 名患者需接受住院治疗。



每 1000 名麻疹患者中就有 1 人会因感染而出现脑肿胀（脑炎），这可能会导致脑损伤。



即使得到了最好的治疗，每 1000 名麻疹患者中仍会有 1 到 3 人死亡。

下一页可查看疫苗接种地点。→

远离麻疹： 接种疫苗



麻腮风 (MMR) 三联疫苗是预防麻疹的最佳方法。所有费城居民均可在各市健康中心进行免费接种。

费城的所有幼儿均可在市健康中心接种疫苗。可致电 215-685-2933 进行预约。

接种时间有限：

市健康中心将在 周一至周五上午 10 点 — 12 点以及下午 1 点 — 3 点为任何费城居民提供无需预约的麻腮风三联疫苗接种服务。

健康中心 3

555 S 43rd St, Philadelphia, PA 19104

健康中心 4

4400 Haverford Ave, Philadelphia, PA 19104

健康中心 5

1900 N 20th St, Philadelphia, PA 19121

无需预约！ 无需身份证件，仅需一封写有您地址的信件即可！



有关麻腮风三联疫苗接种地点的最新信息，请访问 bit.ly/PhilaMeasles。
有关费城麻疹疫情的最新信息，请访问 bit.ly/Measles2024PHL。