

홍역 예방하기: 사실 확인

보건부(Health Department)는 필라델피아에서의 홍역 발병을 추적하는 중입니다. 홍역은 특히 유아와 어린이들에게 위험할 수 있습니다. 홍역은 다른 바이러스에 비해 훨씬 더 전염성이 강합니다.

주로 나타나는 홍역의 초기 증상으로는 발열, 콧물, 기침, 눈 빨개짐, 구강에 하얀 반점이 있습니다. 며칠이 지나면, 얼굴에서부터 붉은 발진이 생기기 시작하여 몸 전체로 내려옵니다

홍역은 폐렴이라는 심각한 폐 감염, 뇌염이라는 뇌부종, 장기간 후유증, 입원, 사망으로 이어질 수 있습니다.

홍역은 어떻게 확산되니까?

S홍역은 주변에 있는 홍역 환자가 기침이나 재채기를 하거나 그저 숨을 쉬는 것을 통해 확산됩니다. 홍역은 홍역 환자에게 발진이 나타나기 전과 증상이 사라진 후에도 확산될 수 있습니다. 홍역 환자가 떠난 지 두 시간이 지나도 방 안에 병균이 남아있을 수 있습니다.

홍역을 예방하는 최선의 보호책은 무엇입니까?

백신을 접종하세요! MMR 백신 접종은 생후 12~15개월에 하고 아이가 4살이 되면 다시 하는 것을 권장합니다. 생후 6개월이 지난 영아는 홍역이 유행하는 국가로 여행 가기 전에 반드시 백신을 접종해야 합니다.



홍역 환자 5명 중 1명 정도는 입원을 해야 할 것입니다.

홍역 환자 1,000명 중 1명은 감염(뇌염)으로 인해 뇌부종이 생겨서 뇌 손상을 입게 될 것입니다.



최상의 치료를 받더라도, 홍역 환자 1,000명 중 1명에서 3명까지는 사망하게 될 것입니다.