

# 远离麻疹：了解相关信息

麻疹在某种程度上是一种危险疾病，对于婴幼儿而言尤为如此。麻疹比其他病毒更具传染性。

麻疹刚开始发作时通常会出现发烧、流鼻涕、咳嗽、眼睛发红以及口腔白点。几天之后，面部会开始出现红色皮疹，并向下蔓延至身体其他部位。


麻疹可导致严重的肺部感染（肺炎）、脑肿胀（脑炎）、长期影响、住院以及死亡。

## 麻疹如何传播？

麻疹会在咳嗽、打喷嚏或单纯只是呼吸的麻疹患者周围传播。麻疹可在麻疹患者出疹前和症状结束后传播。麻疹患者离开房间后，病菌可在房间内存活两小时。

## 预防麻疹的最佳方法是？

接种疫苗！建议在幼儿 12-15 个月大时接种麻腮风三联疫苗，并在幼儿满 4 岁时再次接种。6 个月以上的婴儿应在前往麻疹高发国家/地区之前接种一剂麻腮风三联疫苗。



约 5 名麻疹患者中就有 1 名患者需接受住院治疗。

每 1000 名麻疹患者中就有 1 人会因感染而出现脑肿胀（脑炎），这可能会导致脑损伤。



即使得到了最好的治疗，  
每 1000 名麻疹患者中仍会有 1 到 3 人死亡。

