

RSV

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) — распространенный респираторный вирус, который может вызывать тяжелые, угрожающие жизни симптомы у младенцев и пожилых людей.

Сделать прививку от РСВ рекомендуется пожилым людям (старше 50 лет), младенцам и беременным. Вакцинация помогает защитить тех, кто находится в группе риска.



Кто в группе риска?

- Младенцы, особенно младше шести месяцев
- Маленькие дети, родившиеся преждевременно
- Дети и взрослые с определенными хроническими заболеваниями
- Пожилые люди
- Люди с ослабленной иммунной системой
- Взрослые, проживающие в учреждениях длительного ухода

Каковы симптомы?

- Повышение температуры
- Насморк
- Заложенность носа
- Кашель
- Боль в горле
- Хрипы
- Головная боль
- Усталость

Как распространяется вирус?

РСВ легко распространяется воздушно-капельным путем при кашле и чихании, а также при касании поверхностей, на которых есть вирус, и последующем прикосновении к лицу.




Для получения дополнительной информации отсканируйте QR-код.

Если вас беспокоят симптомы или у вас есть вопросы по поводу них, обратитесь к своему лечащему врачу.

Ограничьте распространение РСВ:

- ✓ Дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются
- ✓ Избегайте тесного контакта с больными людьми
- ✓ При недомогании оставайтесь дома
- ✓ Если заболели, носите маску
- ✓ Часто мойте руки
- ✓ Прикрывайте рот и нос при кашле и чихании
- ✓ При необходимости сделайте прививку



РСВ наиболее активно циркулирует в осенние и зимние месяцы. Если вы подвержены высокому риску тяжелого течения РСВ-инфекции или контактируете с людьми в группе риска, вам следует уделять особое внимание своему здоровью.



Пожилые люди

Новые вакцины против РСВ могут защитить вас от тяжелой формы РСВ-инфекции.

Одна прививка рекомендуется всем взрослым в возрасте 75 лет и старше.

Некоторые взрослые в возрасте 50 лет и старше подвержены повышенному риску тяжелой формы РСВ-инфекции. Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом о необходимости вакцинации.

Беременные

Беременным следует сделать прививку от РСВ, чтобы предотвратить тяжелое течение заболевания у младенцев.

Для получения дополнительной информации обратитесь к своему лечащему врачу.



Младенцы

Младенцам младше восьми месяцев, чьи родители не сделали себе прививку от РСВ во время беременности, следует ввести антитела к РСВ в первый сезон РСВ-инфекции.

Рекомендуемые вопросы для обсуждения с врачом

- Есть ли у меня какие-либо заболевания, которые могут повысить риск тяжелого течения РСВ-инфекции?
- Что мне важно знать о РСВ и других респираторных вирусах в этом сезоне?