

RSV

Virus syncytial pernapasan (RSV) adalah virus saluran pernapasan yang umum dan dapat menimbulkan gejala berat yang mengancam jiwa pada bayi serta orang dewasa yang lebih tua.

Vaksin RSV tersedia untuk lansia (50+), bayi, dan ibu hamil untuk membantu melindungi mereka yang paling berisiko.



Siapa yang berisiko?

- Bayi, khususnya yang berusia kurang dari 6 bulan
- Anak-anak dengan riwayat kelahiran prematur
- Anak-anak dan dewasa dengan kondisi tertentu
- Lansia
- Orang dengan sistem imun yang lemah
- Dewasa yang tinggal di fasilitas perawatan jangka panjang

Apa gejala yang dialami?

- Demam
- Hidung berair
- Hidung tersumbat
- Batuk
- Radang tenggorokan
- Mengi
- Sakit kepala
- Kelelahan

Bagaimana penyebaran virus ini?

RSV dapat menular dengan cepat melalui percikan pernapasan akibat batuk atau bersin, atau melalui kontak dengan permukaan yang mengandung virus lalu menyentuh wajah.



Pindai kode QR untuk informasi lebih lanjut.

Silakan menghubungi tenaga medis Anda apabila Anda merasa khawatir atau ingin memiliki pertanyaan mengenai gejala.

Batasi penyebaran dari RSV:

- ☒ Bersihkan permukaan yang sering tersentuh
- ☒ Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit
- ☒ Tetap di rumah saat sakit
- ☒ Gunakan masker saat sakit
- ☒ Rajin cuci tangan
- ☒ Tutup mulut saat batuk dan bersin
- ☒ Dapatkan vaksinasi jika memenuhi syarat



RSV paling umum menyebar pada musim gugur dan musim dingin. Jika Anda berisiko tinggi terkena infeksi RSV yang parah, atau jika Anda berinteraksi dengan orang-orang yang paling rentan terhadap gejala berat RSV, Anda sebaiknya lebih berhati-hati untuk menjaga kesehatan.

Lansia



Vaksin RSV terbaru dapat melindungi Anda dari infeksi RSV yang parah.

Dosis tunggal direkomendasikan untuk semua lansia yang berusia 75 tahun ke atas.

Beberapa lansia yang berusia 50 tahun ke atas memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit RSV yang parah. Konsultasikan dengan tenaga medis Anda untuk mengetahui apakah Anda memenuhi syarat.

Ibu Hamil

Ibu hamil sebaiknya divaksinasi RSV untuk mencegah keparahan penyakit pada bayi mereka.

Konsultasikan dengan tenaga medis Anda untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.



Bayi



Bayi yang berusia kurang dari 8 bulan dengan orang tua yang tidak menerima vaksinasi RSV selama kehamilan akan menerima antibodi RSV pada musim RSV pertama mereka.

Pertanyaan yang Disarankan untuk Ditanyakan Kepada Dokter Anda

- Apakah saya memiliki kondisi kesehatan yang dapat meningkatkan risiko terkena RSV parah?
- Informasi apa yang perlu saya ketahui mengenai RSV dan virus pernapasan lainnya pada musim ini?