

RSV

呼吸道合胞病毒 (RSV) 是一种常见的呼吸道病毒，可能在婴幼儿和年长群体中引起危及生命的严重症状。

RSV 疫苗已面向年长（50 岁以上）、婴幼儿以及孕妇群体开放接种，能够有效保护高风险人群。



高风险人群

- 婴幼儿，尤其是未满 6 个月的婴儿
- 早产儿
- 存在特定基础疾病的儿童和成人
- 老年人
- 免疫系统较弱者
- 长期住在护理机构中的成人

有哪些症状？

- 发热
- 流鼻涕
- 鼻塞
- 咳嗽
- 咽喉肿痛
- 喘息
- 头痛
- 疲乏

病毒如何传播？

RSV 容易通过咳嗽或喷嚏产生的呼吸道飞沫传播，也可能在触摸被病毒污染的表面后再触碰面部时传播。




请扫描二维码，了解更多信息。

如果您对自身症状感到担忧或有任何疑问，请联系医疗服务机构。

减少 RSV 传播的方法：

- ✓ 清洁经常接触的表面
- ✓ 避免与病人密切接触
- ✓ 生病时呆在家里
- ✓ 生病时戴上口罩
- ✓ 勤洗手
- ✓ 咳嗽或打喷嚏时遮住口鼻
- ✓ 尽可能接种疫苗



RSV 主要在秋冬季节传播。如果您属于严重 RSV 感染高风险人群，或与 RSV 高风险人群接触频繁，应格外注意保持健康。

老年人



最新 RSV 疫苗可以预防严重 RSV 感染。

建议 75 岁或以上的所有人群接种单剂疫苗。

部分 50 岁及以上人群患上严重 RSV 疾病的风险更高。请与医疗服务机构沟通，确认是否符合疫苗接种资格。

孕妇

孕妇应接种 RSV 疫苗以预防婴儿患病。

请向医疗服务机构咨询详情。



婴幼儿



未满 8 个月的婴儿，如果其出生时父母未接种 RSV 疫苗，则应在首个 RSV 流行季接种 RSV 抗体。

建议咨询医生的问题

- 我是否存在可能增加严重 RSV 感染风险的健康状况？
- 我需要在该季节了解哪些有关 RSV 和其他呼吸道病毒的重要信息？