


RSV

ረስፓይራቶሪ ሲንሲቫል ቫይረስ (RSV) በጨቅላ ሕፃናት እና በእድሜ የገፉ አዋቂዎች ላይ ከፍተኛ፣ ለ ሕይወት አስጊ ምልክቶችን የሚያስከትል የተለመደ የመተንፈሻ አካላት ቫይረስ ነው።



በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ የሆኑትን ለመርዳት የRSV ክትባቶች ለአዋቂዎች (50+)፣ ለጨቅላ ሕፃናት፣ እና ነፍሰጡር እናቶች ይሰጣል።



ማን አደጋ ላይ ነው?

- በተለይ ከ 6ወር በታች ያሉ ጨቅላ ሕፃናት
- ጊዜው ሳይሞላ የተወለዱ ሕፃናት
- አንዳንድ የመሰረታዊ የጤና ችግሮች ያለባቸው ህፃናትና አዋቂዎች
- አረጋግያን
- በሽታ የመቋቋም አቅማቸው ደካማ የሆኑ ሰዎች
- በረጅም ጊዜ እንክብካቤ ተቋማት ውስጥ የሚኖሩ አዋቂዎች

ምልክቶቹ ምንድን ናቸው?

- ትኩሳት
- የጉረሮ ህመም
- ንፍጥ መፍሰስ
- ሲር ሲር የሚል ትንፋሽ
- አፍንጫ ማፈን
- ራስ ምታት
- ማሳል
- ድካም

እንዴት ይሰራጫል?

RSV በሳል ወይም በማስነጠስ ጊዜ በሚወጡ የመተንፈሻ ፈሳሾች በቀላሉ ይተላለፋል፤ እንዲሁም ቫይረሱ ያለባቸውን ቦታዎች ነክተው ፊትዎን ሲነኩ ይተላለፋል።



ለበለጠ መረጃ የQR ኮዱን ስካን ያድርጉ

ስለ ምልክቶች ጥያቄ ወይም ስጋት ካሉት በአቅራቢዎ ያሉትን የጤና አገልግሎት ሰጪዎችን ያናግሩ።

የRSV ስርጭትን መግታት

- ✓ ብዙ ጊዜ የሚነኩ ቦታዎችን ያጽዱ
- ✓ በሽታው ካለባቸው ሰዎች ጋር ንክኪ አያድርጉ
- ✓ በህመም ጊዜ ቤት ይቆዩ
- ✓ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ያድርጉ
- ✓ እጆችዎን በተደጋጋሚ ይታጠቡ
- ✓ በሚያስሉበት እና በሚያስነጥሱበት ጊዜ አፍን ይሸፍኑ
- ✓ የሚችሉ ከሆነ ክትባት ይውሰዱ




RSV በበልግ እና በክረምት ወቅት የበለጠ ይሰራጫል። በከፍተኛ የሻይረስ ኢንፌክሽን የመያዝ ከፍተኛ ስጋት ላይ ከመሆኑ ወይም በRSV ከፍተኛ ሁኔታ ሊታመሙ ከሚችሉ ስዎች ጋር ከተገናኙ፣ ጤናማ ሆኖ ለመቆየት ተጨማሪ ጥንቃቄ ማድረግ አለብዎት።



አረጋውያን

RSV ክትባት ከባድ RSV ኢንፌክሽን እንዳይዘዎ ይጠብቅዎታል።

75 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆናቸው አረጋውያን አንድ መጠን ክትባት ይመከራል።

አንዳንድ 50 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆናቸው አዋቂዎች የRSV ተገላጭነታቸው ከፍ ያለ ነው። ስለ ብቁነትዎ የጤና አገልግሎት ከሚሰጧቸው ጋር ይነጋገሩ።

ነፍሰጡር የሆኑ ሰዎች

ነፍሰጡር የሆኑ ሰዎች በፅንሱ ላይ ከባድ RSV እንዳይከሰት መከተብ አለባቸው።

ለበለጠ መረጃ በአቅራቢዎ ካሉ የጤና አገልግሎት ሰጪዎች ጋር ይነጋገሩ።



ጨቅላ ህፃናት

ከ8 ወር በታች ያሉ ጨቅላ ህፃናት ወላጅ እናታቸው በእርግዝና ወቅት RSV ክትባት ካልወሰዱ፣ በመጀመሪያው RSV ወቅት የRSV አንቲቦዲ ማግኘት አለባቸው።

ሐኪሞን ሊጠይቁ የሚችሏቸው ጥያቄዎች

- ለከባድ RSV ተገላጭ የሚያደርጉ የጤና እክሎች አሉብኝ?
- በዚህ ወቅት ስለ RSV እና ስለ ሌሎች የመተንፈሻ አካላት ሻይረሶች ማወቅ ያለብኝ አስፈላጊ ነገሮች ምንድናቸው?