

新型冠状病毒感染 (COVID-19) 可导致短期或长期患病，有时甚至导致死亡。

新型冠状病毒感染 (COVID)

所有 6 月龄及以上的人群均可接种更新版新冠疫苗。接种疫苗可保护您和身边的人，降低发生新冠重症的风险。



哪些人群发生重症的风险较高？

- 老年人
- 婴儿及 5 岁以下的幼儿
- 免疫系统较弱者
- 特定残障人士
- 孕妇
- 存在某些健康状况的人群

有哪些症状？

- 发热或寒战
- 咽痛或咳嗽
- 呼吸困难
- 流鼻涕或鼻塞
- 头痛
- 恶心或呕吐
- 身体疼痛
- 新出现的味觉或嗅觉丧失

新冠病毒如何传播？

新冠病毒可通过感染者咳嗽或打喷嚏传播，也可通过接触受病毒污染的物体表面后再触摸自己的面部而传播。

感染者在出现任何症状之前，就可能将病毒传播给别人。



请扫描二维码，了解更多信息。

如有疑问，请联系您的医疗服务提供者。即使没有医疗保险，仍可获取免费或低价的医疗服务。请访问

phila.gov/primary-care。

减少新冠病毒传播：

- ☒ 接种疫苗
- ☒ 勤洗手
- ☒ 避免与病人密切接触
- ☒ 咳嗽或打喷嚏时遮住口鼻
- ☒ 生病时待在家里
- ☒ 生病时戴上口罩
- ☒ 清洁经常接触的物体表面，并采取措施改善空气质量



新冠疫苗

病毒可能随时发生变化。新冠疫苗会不断更新，以针对当前流行的毒株为您提供最佳保护。



新冠疫苗安全吗？

安全。所有新研发和更新版新冠疫苗在获得美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准前，均经过全面测试。

已有数百万人接种新冠疫苗，美国疾病控制与预防中心 (CDC) 持续监测疫苗的安全性和有效性。

哪些人应接种新冠疫苗？

所有 6 月龄及以上的人群现在均可接种更新版新冠疫苗。

免疫系统较弱者和低龄儿童的家长应咨询医疗服务提供者，了解本人或孩子在本流行季是否需要接种超过一剂的疫苗。

特别建议重症风险较高的人群接种新冠疫苗，包括：

- 6 至 23 月龄的儿童
- 65 岁及以上的成人
- 免疫系统较弱者
- 孕妇
- 有慢性健康问题的人群，如肺部疾病、糖尿病和心脏疾病



为什么应接种新冠疫苗？

接种新冠疫苗可降低您因感染新冠病毒而发生重症或死亡的风险。

按时接种最新的新冠疫苗，可帮助您抵御当前流行的病毒株。

咨询医疗服务提供者的问题

- 我是否存在可能增加新冠重症风险的健康状况？
- 如果感到不适，我应该如何照顾自己的健康，又该如何保护身边的人？