

VRS

El virus respiratorio sincitial (VRS) es un virus respiratorio común que puede causar síntomas graves y potencialmente mortales en lactantes y adultos mayores.

Las vacunas contra el VRS están disponibles para adultos mayores, bebés y mujeres embarazadas, a fin de ayudar a proteger a quienes corren mayor riesgo.



¿Quiénes están en riesgo?

- Lactantes, especialmente los menores de 8 meses
- Niños pequeños nacidos prematuramente
- Niños y adultos con ciertas afecciones subyacentes
- Adultos mayores
- Personas con sistemas inmunitarios debilitados
- Adultos que viven en centros de atención a largo plazo

¿Cuáles son los síntomas?

- Fiebre
- Secreción nasal
- Congestión
- Tos
- Dolor de garganta
- Sibilancias
- Dolor de cabeza
- Cansancio

¿Cómo se propaga?

El VRS se propaga a través de la tos o el estornudo de una persona infectada, o al tocar superficies contaminadas con el virus y luego tocarse la cara.




Escanee el código QR para obtener más información.

Comuníquese con su proveedor de atención médica si le preocupa algo o tiene preguntas sobre los síntomas.

Limite la propagación del VRS:

- ☒ Vacúnese, si es apto
- ☒ Lávese las manos con frecuencia
- ☒ Evite el contacto cercano con personas enfermas
- ☒ Cúbrase al toser y estornudar
- ☒ Quédese en su hogar si está enfermo
- ☒ Use una mascarilla si está enfermo
- ☒ Limpie las superficies que se tocan con frecuencia



Vacunación contra el VRS

El VRS circula principalmente durante los meses de otoño e invierno.
Hay vacunas disponibles para proteger a las personas con mayor riesgo.



Adultos mayores

Las vacunas contra el VRS pueden protegerlo de una infección grave causada por este virus.

Se recomienda una dosis única para todos los adultos mayores de 75 años.

Los adultos de 50 a 74 años con un mayor riesgo de enfermedad grave por el VRS también pueden protegerse con una vacuna.

Mujeres embarazadas

Las mujeres embarazadas pueden vacunarse contra el VRS para prevenir enfermedades graves en sus bebés.

Esta protección puede durar aproximadamente 6 meses después del nacimiento.



Bebés

Los bebés menores de 8 meses cuyo progenitor biológico no recibió la vacuna contra el VRS durante el embarazo deben recibir la vacuna durante su primera temporada de VRS.

Preguntas sugeridas para hacerle a su médico

- ¿Tengo alguna afección de salud que pueda aumentar mi riesgo de sufrir una infección grave por el VRS?
- ¿Qué es importante que sepa sobre el VRS y otros virus respiratorios esta temporada?