

РСВ

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) — это распространенный респираторный вирус, который может вызывать тяжелые, опасные для жизни симптомы у младенцев и пожилых людей.

Вакцины от РСВ доступны для пожилых людей, младенцев и беременных, чтобы помочь защитить людей, наиболее подверженных риску тяжелого заболевания.



Кто находится в группе риска?

- Младенцы, особенно дети до 8 месяцев
- Маленькие дети, родившиеся преждевременно
- Дети и взрослые с некоторыми сопутствующими заболеваниями
- Пожилые люди
- Люди с ослабленным иммунитетом
- Взрослые, проживающие в учреждениях долгосрочного ухода

Какие возникают симптомы?

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| • Повышенная температура | • Боль в горле |
| • Насморк | • Свистящее дыхание |
| • Заложенность носа | • Головная боль |
| • Кашель | • Усталость |

Как распространяется это заболевание?

РСВ может передаваться при кашле или чихании инфицированного человека, а также при прикосновении к зараженным поверхностям и последующем прикосновении к лицу.



Чтобы получить более подробную информацию, отсканируйте QR-код.

Обратитесь к своему врачу, если вы обеспокоены или у вас есть вопросы о симптомах РСВ.

Чтобы необходимо делать, чтобы снизить распространение РСВ?

- ☒ Вакцинироваться, если это рекомендовано.
- ☒ Чаше мыть руки.
- ☒ Избегать тесного контакта с заболевшими.
- ☒ Прикрывать рот при кашле и чихании.
- ☒ Оставаться дома, если вы заболели.
- ☒ Носить маску, если вы заболели.
- ☒ Регулярно очищать поверхности, к которым часто прикасаются.



Вакцина от РСВ

РСВ наиболее распространен в осенние и зимние месяцы.

Для защиты людей, подверженных риску тяжелого заболевания, доступна вакцинация.



Пожилые люди

Вакцины от РСВ могут защитить вас от тяжелой инфекции, вызванной РСВ.

Всем взрослым в возрасте от 75 лет рекомендуется однократная доза вакцины.

Взрослые в возрасте от 50 до 74 лет с повышенным риском тяжелого заболевания, вызванного РСВ, также могут защититься с помощью вакцинации.

Беременные

Беременным рекомендуется вакцинация от РСВ, чтобы предотвратить тяжелое течение заболевания у младенцев.

Такая защита может сохраняться примерно в течение 6 месяцев после рождения ребенка.



Младенцы



Младенцам младше 8 месяцев, мать которых не была вакцинирована от РСВ во время беременности, следует получить вакцину от РСВ в течение первого сезона РСВ.

Вопросы, которые рекомендуется задать врачу

- Есть ли у меня заболевания, повышающие риск тяжелого течения РСВ?
- Что мне важно знать о РСВ и других респираторных вирусах в этом сезоне?