

呼吸道合胞病毒 (RSV)

呼吸道合胞病毒 (RSV) 是一种常见的呼吸道病毒，可导致婴儿和老年人出现严重、甚至危及生命的症状。

老年人、婴儿和孕期人群均有适用的 RSV 免疫制剂可供接种，以帮助保护风险最高的人群。



高风险人群

- 婴儿，尤其是未满 8 月龄的婴儿
- 早产的幼儿
- 存在特定基础疾病的儿童和成人
- 老年人
- 免疫系统较弱者
- 居住在长期照护机构的成人

有哪些症状？

- 发热
- 流鼻涕
- 鼻塞
- 咳嗽
- 咽痛
- 喘息
- 头痛
- 疲乏

RSV 如何传播？

RSV 可通过感染者咳嗽或打喷嚏传播，也可通过接触受病毒污染的物体表面后再触摸自己的面部而传播。



请扫描二维码，了解更多信息。

如果您对症状感到担忧或有任何疑问，请联系您的医疗服务提供者。

减少 RSV 传播的方法：

- ☒ 如符合接种条件，请接种疫苗
- ☒ 勤洗手
- ☒ 避免与病人密切接触
- ☒ 咳嗽或打喷嚏时遮住口鼻
- ☒ 生病时待在家里
- ☒ 生病时戴上口罩
- ☒ 清洁经常接触的表面



RSV 免疫接种

RSV 主要在秋冬季节流行。

接种免疫制剂可保护风险最高的人群。

老年人



RSV 疫苗可帮助您预防重症 RSV 感染。

建议所有 75 岁及以上的成人接种一剂疫苗。

发生重症 RSV 感染风险较高的 50 至 74 岁成人，也可通过接种疫苗获得保护。

孕妇

孕妇可接种 RSV 疫苗，以预防其婴儿发生重症 RSV 感染。

这种保护作用可持续至婴儿出生后约 6 个月。



婴儿

对于 8 月龄以下的婴儿，如果其生育方在孕期末接种 RSV 疫苗，应在婴儿出生后的首个 RSV 流行季为其接种 RSV 免疫制剂。

建议咨询医生的问题

- 我是否存在可能增加重症 RSV 风险的健康状况？
- 关于本流行季的 RSV 和其他呼吸道病毒，我需要了解哪些重要信息？